

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

FEMALTO

drops

Hướng dẫn cách sử dụng xi lanh



1. Gắn Xi lanh

Gắn xi lanh khít vào adaptor trên miệng lọ. Đốc ngược lọ, kéo xi lanh rồi bơm ngược trở lại để đuổi hết bọt khí.



2. Lấy dung dịch

Kéo xi lanh ra một khoảng tương ứng lượng cần dùng, xoay lọ lại và tháo xi lanh ra.

3. Cho bé uống

Cho xi lanh vào miệng bé, hướng về phía má trong, tránh bơm thẳng vào họng bé, sau đó bơm từ từ dung dịch cho bé uống.



4. Vệ sinh xi lanh

Sau khi sử dụng, tháo phần vỏ và thân xi lanh, xả sạch dưới vòi nước rồi phơi khô. Lau miệng lọ bằng khăn giấy, đậy nắp. Lưu ý: Không sử dụng nhiệt độ cao để tiệt trùng xi lanh.

THÀNH PHẦN:

Mỗi 0,1ml chứa:

Sắt 5mg (dưới dạng 17mg phức hợp sắt (III) hydroxyd polymaltose)

Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (đường kính); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 420(i)); Chất điều chỉnh độ nhớt (natri clorid); Chất điều chỉnh độ acid (INS 330, INS 524); Hương liệu tổng hợp (hương hoa quả, hương vanillin); Chất bảo quản (INS 216, INS 218); nước tinh khiết.

CÔNG DỤNG:

- Bổ sung sắt cho người có nguy cơ thiếu sắt.
- Bổ sung sắt tham gia hỗ trợ quá trình tạo máu.
- Giảm triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Trẻ em và người lớn:

- Thiếu máu do thiếu sắt.
- Có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.
- Phụ nữ mất máu do kinh nguyệt nhiều.
- Có chế độ ăn thiếu sắt.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Liều dự phòng thiếu sắt:

- Trẻ dưới 1 tuổi: 0,2ml/lần x 1 lần/ngày.
- Trẻ từ 1-dưới 14 tuổi: 0,3ml/lần x 1 lần/ngày.
- Người lớn, trẻ em từ 14 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú: 0,5ml/lần x 1 lần/ngày.

Liều bổ sung khi thiếu sắt:

- Trẻ dưới 1 tuổi: 0,5ml/lần x 1 lần ngày.
- Trẻ từ 1-dưới 14 tuổi: 0,5ml/lần x 1 lần/ngày. Có thể điều chỉnh liều lên 1ml/ngày, tùy theo chỉ định của cán bộ y tế, bác sĩ, dược sĩ.
- Người lớn, trẻ em từ 14 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú: 0,5ml/lần x 1 lần/ngày. Có thể điều chỉnh liều lên 1ml/ngày, tùy theo chỉ định của cán bộ y tế, bác sĩ, dược sĩ.
- Trẻ sinh non: 2,5 - 5mg sắt/kg/ngày trong 3-5 tháng.

* Lắc kỹ trước khi sử dụng sản phẩm

CẢNH BÁO THẬN TRỌNG:

Không sử dụng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Không dùng chung với các sản phẩm chứa sắt khác.

BẢO QUẢN

Không quá 30°C, tránh ánh nắng trực tiếp.



Nhà sản xuất và thương nhân chịu trách nhiệm:

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM- NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

T1-1-160625
S00012, S00015,
S00034