

XỊT MIỆNG HỌNG

# GUTE SPRAY

## 1. THÀNH PHẦN:

Benzydamin hydroclorid, cetylpyridinium clorid, natri saccharin, propylen glycol, ethanol, PEG-40 hydrogenated castor oil, menthol, eucalyptol, thymol, tinh dầu bạc hà, glycerin, methyl p-hydroxybenzoat, nước tinh khiết.

## 2. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 chai 30 ml.

## 3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

- Hỗ trợ giảm triệu chứng đau rát, sưng, viêm ở họng và miệng trong các trường hợp như viêm họng, viêm amidan, ho, loét miệng, nhiệt miệng, chân tay miệng.
- Giúp sát khuẩn và ngăn ngừa bội nhiễm vùng miệng họng.
- Giúp giảm viêm đau trong trường hợp viêm amidan, viêm họng, viêm nướu, mọc răng khôn, viêm nha chu, sau phẫu thuật nha khoa, niềng răng.
- Giúp dịu họng, dịu ho do đờm hoặc kích ứng.

## 4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho người quá mẫn cảm với một trong các thành phần của sản phẩm.

Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

## 5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

*Trong trường hợp ho đờm hoặc có mũi dãi, nên vệ sinh sạch mũi trước khi sử dụng sản phẩm.*

Trong lần sử dụng đầu tiên, xịt mỗi vài liều đến khi tạo thành sương mịn ở lần xịt đầu tiên.

Xịt trực tiếp vào họng hoặc vào vùng răng miệng bị đau, quanh nha chu.

- **Sử dụng trong sưng viêm họng, amidan, giảm ho** (không dùng ngay trước khi ăn hoặc uống để tránh làm trôi sản phẩm):

**Người lớn, trẻ em từ 12 tuổi trở lên:** 4-8 liều xịt mỗi 1,5-3 giờ.

**Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi:** 3-4 liều xịt mỗi 1,5-3 giờ.

- **Sử dụng trong giảm đau để hỗ trợ ăn uống hoặc giảm đau thông thường:**

Xịt vào vị trí đau 5-8 nhát tùy vào vùng đau rộng hay hẹp trước khi ăn 10 phút để giúp ăn uống được dễ dàng.

## 6. BẢO QUẢN:

Trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

## 7. HẠN DÙNG:

Xem trên nhãn hộp.

## CÁC BƯỚC SỬ DỤNG CHAI XỊT MIỆNG HỌNG LẦN ĐẦU



**Bước 1:** Lắp đầu xịt vào chai



**Bước 2:** Để chai xịt miệng họng trên mặt phẳng như mặt bàn, dùng lòng bàn tay ấn mạnh từ trên xuống cho đến khi nghe thấy tiếng **"TÁCH"** là đã lắp đúng vị trí



**Bước 3:** Tháo nắp bảo vệ khỏi đầu xịt



**Bước 4:** Xịt mỗi vài liều đến khi tạo thành sương mịn ở lần xịt đầu tiên



**Bước 5:** Sử dụng xịt vào vùng bị đau

Nhà sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:



**CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM - NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM**

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

T1-5-090725  
M00017