

THỤT TÁO BÓN

3 years⁺

Novolax

Enema

GIỚI THIỆU:

Khi bị táo bón, bên cạnh việc sử dụng các biện pháp cải thiện táo bón về lâu về dài, thì thụt là biện pháp cấp thiết giúp giải quyết ngay lập tức phân cứng tồn đọng. Sử dụng thụt giúp đi tiêu dễ hơn, tránh các biến chứng nghiêm trọng như nứt kẽ hậu môn, tắc nghẽn ruột, tổn thương trực tràng, trĩ...

Thụt táo bón **Novolax Enema** giúp BÀI TIẾT NHẹ NHÀNG, AN TOÀN chỉ từ 5 - 15 phút sử dụng nhờ cơ chế đa tác dụng: Tăng nhu động ruột tự nhiên - Làm mềm phân - Làm trơn dịu mát:

- Sorbitol giúp quá trình hấp thu nước từ các mô vào ruột được nhanh hơn. Từ đó, làm gia tăng trương lực nước tại đây, kích thích nhu động ruột một cách tự nhiên, không ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
- Natri citrat dihydrat làm tăng áp suất thẩm thấu trong lòng ruột nên tăng lưu giữ nước, làm mềm phân.
- Glycerin và chiết xuất diệp cá giúp làm trơn, dịu mát niêm mạc trực tràng.

Sản phẩm được thiết kế dưới dạng dung dịch, đóng trong tuýp với một đầu phun và một đầu chứa dịch. Đầu phun mềm, được bo tròn không gây tổn thương trực tràng khi sử dụng. Bầu tuýp có rãnh nếp tạo đà đẩy dễ dàng, giúp thuận tiện lấy toàn bộ dịch đi vào trực tràng, kể cả ở tư thế thẳng đứng.

Thụt táo bón Novolax Enema 3 years⁺ là giải pháp giúp giải quyết ngay lập tức tình trạng phân cứng khó đi tiêu, đặc biệt là các trường hợp táo bón nặng và kéo dài.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. THÀNH PHẦN:

Sorbitol, Glycerin, Natri citrat dihydrat, Chiết xuất diệp cá, Methyl parahydroxybenzoat, Propyl parahydroxybenzoat, Acid citric, Nước.

2. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 12 tuýp 6ml.

3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

- Hỗ trợ điều trị táo bón không thường xuyên và táo bón mạn tính ở người lớn và trẻ em từ 3 tuổi. Đặc biệt là các nhóm đối tượng phải thường xuyên ngồi nhiều, ít vận động hoặc chế độ ăn ít chất xơ, uống không đủ nước như nhân viên văn phòng, tài xế lái xe...
- Hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón của người bị trĩ, phụ nữ mang thai, sau sinh, người cao tuổi...
- Cải thiện tình trạng táo bón ở bệnh nhân nằm liệt giường, nằm lâu ngày trong lão khoa, nhi khoa, sản khoa.
- Bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật hoặc trước khi thực hiện thủ thuật cần làm sạch trực tràng.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không sử dụng cho người quá mẫn với một trong các thành phần của sản phẩm.

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:


Dùng qua đường trực tràng. Dùng 1 tuýp 6ml/ngày. Dùng trước thời điểm đi đại tiện 5 - 15 phút.

Novolax Enema rất dễ sử dụng ở tư thế ngồi xổm hoặc ở tư thế thông thường khi đi vệ sinh. Sản phẩm hoạt động bằng cách bơm thẳng trực tiếp dung dịch vào trực tràng qua đường hậu môn:



Bước 1:

1. Mở nắp đầu thụt.
2. Bóp nhẹ bầu thụt để nhỏ 1 - 2 giọt ra đầu ngón tay.
3. Dùng đầu ngón tay bôi trơn đầu thụt dài của tuýp, giúp cho đầu tuýp trở nên trơn mượt khi thụt.



Bước 2:

Đưa đầu thụt hoàn toàn vào trực tràng.



Bước 3:

Bóp mạnh, đẩy gần hết dung dịch vào trực tràng. Sau khi chất lỏng vào hết thì nhẹ nhàng rút thụt ra khỏi hậu môn. Sau đó đứng dậy và siết chặt cơ mông trong khoảng 1 phút để dịch không chảy ra ngoài.

**Sau khi sử dụng, có dư 1 lượng nhỏ dung dịch trong tuýp, thể tích dịch đã được nhà sản xuất đóng dư để đảm bảo liều dùng đúng khuyến cáo.*

Sản phẩm sẽ có hiệu quả sau 5 - 15 phút tùy cơ địa từng người, do vậy hãy chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho việc đi đại tiện ngay sau khi thụt.

*Lưu ý: Hệ thống tiêu hóa của mỗi người là khác nhau. Trong một số trường hợp, có thể có sự chậm trễ trước khi sản phẩm có hiệu lực, vì vậy phải luôn đợi tối đa một giờ. Nếu không có gì xảy ra sau thời gian này, có thể sử dụng tuýp **Novolax Enema** thứ hai. Nếu vẫn không giảm táo bón sau khi sử dụng tuýp thứ hai, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ, để xác định lại nguyên nhân gây táo bón và đưa phương pháp điều trị thay thế tốt nhất có thể.*

6. BẢO QUẢN: Trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

7. HẠN DÙNG: Xem trên mặt ngoài nhãn hộp.



Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM - NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam