

XỊT MIỆNG

GUTE FREEZE SPRAY

1. THÀNH PHẦN:

Glycerin, Povidon, Chiết xuất Lô hội, Dexpanthenol, Xylitol, PVM/MA Copolymer, Propylen glycol, Natri hyaluronat, Dikali glycyrrhizinat, Methyl p-hydroxybenzoat, Cetylpyridinium clorid, Propyl p-hydroxybenzoat, Hương, Natri hydroxyd, Nước.

2. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 chai 26 g.

3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

- Giúp làm dịu, mát, làm giảm cảm giác khó chịu trong các trường hợp nhiệt miệng, viêm lợi, viêm nướu, mọc răng khôn, đau răng.
- Giúp làm sạch, tạo lớp màng giúp che phủ vết loét, giúp kháng khuẩn vùng miệng.
- Bảo vệ, hạn chế kích ứng cho niêm mạc miệng khi ăn uống, giúp ăn uống thuận tiện, dễ dàng khi bị nhiệt miệng, viêm miệng.

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho các vết loét do viêm nhiễm, nhiệt miệng, chân tay miệng, các vết rách nhỏ, vết chà xát và các chấn thương gây ra bởi niềng răng và các thủ thuật nha khoa, các vết thương gây ra do phẫu thuật.

Sản phẩm phù hợp dùng cho nhiều lứa tuổi. Dùng được cho cả trẻ em từ 2 tháng tuổi và phụ nữ cho con bú.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho người quá mẫn cảm với một trong các thành phần của sản phẩm.

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cách dùng:

Xịt trực tiếp vào vị trí vết thương, mỗi lần xịt 2-4 nhát để che phủ vết thương. Sử dụng 2-5 lần một ngày tùy mức độ đau và loét. An toàn khi nuốt phải.

Đợi ít nhất 2 phút để sản phẩm tạo màng ngăn sinh học giúp giảm đau và hỗ trợ lành thương.

Lưu ý:

Hạn chế ăn hoặc uống trong vòng 30 phút sau khi sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả cao nhất.

Trường hợp giảm đau khi ăn uống nên xịt trước bữa ăn 10 phút.

Sau một thời gian không sử dụng, khi sử dụng lại cần xịt mỗi vài liều đến khi tạo thành tia.

6. BẢO QUẢN:

Nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

7. HẠN DÙNG:

Xem trên nhãn hộp.

CÁC BƯỚC SỬ DỤNG CHAI XỊT MIỆNG HỌNG LẦN ĐẦU



Bước 1: Lắp đầu xịt vào chai



Bước 2: Để chai trên mặt phẳng như mặt bàn, dùng lòng bàn tay ấn mạnh từ trên xuống cho đến khi nghe thấy tiếng **"TÁCH"** là đã lắp đúng vị trí



Bước 3: Tháo nắp bảo vệ khỏi đầu xịt



Bước 4: Xịt mỗi vài liều đến khi tạo thành tia ở lần xịt đầu tiên



Bước 5: Sử dụng xịt vào vùng bị đau



Bước 6: Lau đầu vòi xịt sau khi sử dụng