

XỊT MIỆNG HỌNG

# GUTE SPRAY

## 1. THÀNH PHẦN:

Benzydamin hydroclorid, cetylpyridinium clorid, natri saccharin, propylen glycol, ethanol, PEG-40 hydrogenated castor oil, menthol, eucalyptol, thymol, tinh dầu bạc hà, glycerin, methyl p-hydroxybenzoat, nước tinh khiết.

## 2. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 chai 30 ml.

## 3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

- Hỗ trợ giảm triệu chứng đau rát, sưng, viêm ở họng và miệng trong các trường hợp như viêm họng, viêm amidan, ho, loét miệng, nhiệt miệng, chân tay miệng.
- Giúp sát khuẩn và ngăn ngừa bội nhiễm vùng miệng họng.
- Giúp giảm viêm đau trong trường hợp viêm amidan, viêm họng, viêm nướu, mọc răng khôn, viêm nha chu, sau phẫu thuật nha khoa, niềng răng.
- Giúp dịu họng, dịu ho do đờm hoặc kích ứng.

## 4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho người quá mẫn cảm với một trong các thành phần của sản phẩm. Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

## 5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Trong trường hợp ho đờm hoặc có mũi dãi, nên vệ sinh sạch mũi trước khi sử dụng sản phẩm.

Trong lần sử dụng đầu tiên, xịt mỗi vài liều đến khi tạo thành sương mịn ở lần xịt đầu tiên.

Xịt trực tiếp vào họng hoặc vào vùng răng miệng bị đau, quanh nha chu.

- **Sử dụng trong sưng viêm họng, amidan, giảm ho** (không dùng ngay trước khi ăn hoặc uống để tránh làm trôi sản phẩm):

**Người lớn, trẻ em từ 12 tuổi trở lên:** 4-8 liều xịt mỗi 1,5-3 giờ.

**Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi:** 3-4 liều xịt mỗi 1,5-3 giờ.

- **Sử dụng trong giảm đau để hỗ trợ ăn uống hoặc giảm đau thông thường:**

Xịt vào vị trí đau 5-8 nhát tùy vào vùng đau rộng hay hẹp trước khi ăn 10 phút để giúp ăn uống được dễ dàng.

## 6. CẢNH BÁO THẬN TRỌNG:

Không dùng cho người quá mẫn cảm với một trong các thành phần của sản phẩm.

## 7. BẢO QUẢN:

Trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

## 8. HẠN DÙNG:

Xem trên nhãn hộp.

## CÁC BƯỚC SỬ DỤNG CHAI XỊT MIỆNG HỌNG LẦN ĐẦU



**Bước 1:** Lắp đầu xịt vào chai



**Bước 2:** Để chai xịt miệng họng trên mặt phẳng như mặt bàn, dùng lòng bàn tay ấn mạnh từ trên xuống cho đến khi nghe thấy tiếng **"TÁCH"** là đã lắp đúng vị trí



**Bước 3:** Tháo nắp bảo vệ khỏi đầu xịt



**Bước 4:** Xịt mỗi vài liều đến khi tạo thành sương mịn ở lần xịt đầu tiên



**Bước 5:** Sử dụng xịt vào vùng bị đau

Nhà sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:



**CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM - NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM**

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà,  
Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam