

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

FEMALTO

drops

Hướng dẫn cách sử dụng tếp BFS



Bước 1

Vấy mạnh theo chiều từ trên xuống dưới, hạn chế dung dịch đọng ở phần nắp, tránh văng đổ khi mở.



Bước 2

Xoay nhẹ phần nắp nhựa phía trên để mở.

Lưu ý: Phần dung dịch còn đọng lại ở nắp đã được tính toán trong quá trình sản xuất để không ảnh hưởng đến liều lượng sử dụng.



Bước 3

Bóp nhẹ phần thân tếp và sử dụng trực tiếp.



Bước 4

Đậy nắp bằng cách ấn chặt phần nắp vào đầu tếp để bảo quản, trong trường hợp cần chia thành nhiều lần sử dụng.

THÀNH PHẦN:

Mỗi 0,1ml chứa:

Sắt 5mg (dưới dạng 17mg phức hợp sắt (III) hydroxyd polymaltose)

Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (đường kính); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 420(ii));

Chất điều chỉnh độ nhớt (natri clorid); Chất điều chỉnh độ acid (INS 330, INS 524);

Hương liệu tổng hợp (hương hoa quả, hương vanillin); Chất bảo quản (INS 216, INS 218); Nước tinh khiết.

CÔNG DỤNG:

- Bổ sung sắt cho người có nguy cơ thiếu sắt.
- Bổ sung sắt tham gia hỗ trợ quá trình tạo máu.
- Giảm triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Trẻ em và người lớn:

- Thiếu máu do thiếu sắt.
- Có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.
- Phụ nữ mất máu do kinh nguyệt nhiều.
- Có chế độ ăn thiếu sắt.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Liều dùng khi có nguy cơ thiếu sắt:

- Trẻ từ 0 - dưới 14 tuổi: 0,25ml (1/2 tếp, khoảng 7-8 giọt)/ngày.
- Người lớn, trẻ em từ 14 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú: 0,5ml (1 tếp)/ngày.

Liều dùng cải thiện triệu chứng thiếu sắt:

- Trẻ dưới 1 tuổi: 0,5ml (1 tếp)/ngày.
- Trẻ từ 1 - dưới 14 tuổi: 0,5ml (1 tếp)/ngày.
(Có thể điều chỉnh liều lên 1ml (2 tếp)/ngày, tùy theo chỉ định của cán bộ y tế)
- Người lớn, trẻ em từ 14 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú: 0,5ml (1 tếp)/ngày.
(Có thể điều chỉnh liều lên 1ml (2 tếp)/ngày, tùy theo chỉ định của cán bộ y tế)
- Trẻ sinh non: 2,5 - 5mg sắt/kg/ngày trong 3 - 5 tháng.

* **Chú ý lắc kỹ trước khi dùng.**

CẢNH BÁO THẬN TRỌNG:

Không sử dụng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Không dùng chung với các sản phẩm chứa sắt khác.

BẢO QUẢN: Không quá 30°C, tránh ánh nắng trực tiếp.



Nhà sản xuất và thương nhân chịu trách nhiệm:
CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM - NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM
 Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà,
 Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam