

Novofemi

pH REVIVE suppo

Viên đặt phục hồi

1. Thành phần:

Acid lactic, fructo-oligosaccharide, inulin, sodium hyaluronate, methyl parahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate, PEG 400, PEG 4000.

2. Quy cách đóng gói:

Hộp chứa 2 vỉ x 7 viên.

3. Mục đích sử dụng:

- Cân bằng pH âm đạo và hệ vi sinh vật âm đạo sau đợt điều trị kháng sinh và kháng nấm.
- Giảm dịch tiết bất thường và mùi hôi.
- Giảm các triệu chứng ngứa rát âm đạo trong trường hợp viêm nhiễm nhẹ và trung bình hoặc cho phụ nữ mang thai chưa cần sử dụng kháng sinh, kháng nấm.
- Phòng ngừa các bệnh viêm nhiễm âm đạo cho người hay bị tái phát, phụ nữ tiền mãn kinh giúp giảm triệu chứng và tần suất tái phát viêm nhiễm âm đạo.
- Làm dịu và duy trì độ ẩm cho âm đạo và giúp hồi phục niêm mạc âm đạo.

4. Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

5. Hướng dẫn sử dụng:

Nên sử dụng sản phẩm trước khi đi ngủ để có hiệu quả cao nhất.

Sản phẩm dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú, phụ nữ tiền mãn kinh.

Liều dùng thông thường cho các chỉ định:

- Phòng ngừa viêm nhiễm âm đạo cho người hay bị ngứa hay có dịch tiết bất thường: 1 viên/ngày trong 7-14 ngày.
- 1 viên/ngày trước khi đi ngủ trong 3-5 ngày sau chu kỳ kinh nguyệt.
- Với phụ nữ tiền mãn kinh: dùng 1 viên/ngày để phòng viêm nhiễm và duy trì độ ẩm âm đạo, hạn chế khô âm đạo.

Đối tượng sử dụng:

- Phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa, nấm ngứa, đau rát âm đạo, khí hư bất thường.
- Người có nguy cơ viêm phụ khoa, người cần dự phòng viêm âm đạo tái phát.
- Phụ nữ sau chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ đang mang thai và sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh.

Chú ý:

- Sử dụng viên đặt khi niêm mạc âm đạo đã lành, để tránh bị xót hay kích ứng.
- Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản ở điều kiện thường, hình dạng của viên không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm do đã đóng gói đơn liều trong mỗi viên. Trước khi dùng nên để trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ từ 2°C-8°C trong 10 phút hoặc dài hơn. Kiểm tra viên đặt trước khi dùng phải đảm bảo đủ độ cứng, dễ dàng đưa viên đặt vào âm đạo. Bóc viên ra phải đưa vào âm đạo nhanh, vì rời lớp vỏ, viên dễ tan nhanh.

6. Bảo quản: Trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 25°C.

7. Hạn dùng: Xem trên nhãn hộp.

Sản xuất và chịu trách nhiệm bởi:



CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM - NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà,

Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam