

GEL BẢO VỆ LÀM DỊU NIÊM MẠC MIỆNG

GUTE
— FREEZE ❄️

1. THÀNH PHẦN:

Aloe vera extract, Dexpanthenol, Dipotassium glycyrrhizinate, Povidone K30, Sodium hyaluronate và phụ liệu khác.

2. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 chai 20 g.

3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

- Tạo lớp màng bảo vệ giúp che phủ vết loét, giảm kích ứng, đau rát và hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên của niêm mạc miệng.
- Giúp làm dịu, mát, làm giảm cảm giác khó chịu khi có vết loét trong khoang miệng.
- Hạn chế kích ứng niêm mạc miệng giúp ăn uống dễ dàng khi có vết loét trong khoang miệng.
- Thích hợp sử dụng trong trường hợp: nhiệt miệng, nhiệt lưỡi, loét miệng do tay chân miệng, viêm lợi, viêm nha chu, loét miệng do niềng răng, sau phẫu thuật nha khoa.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho người quá mẫn cảm với một trong các thành phần của sản phẩm.

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cách dùng:

Khi sử dụng lần đầu, để khởi động valve xịt, ấn đầu vòi xịt từ 2 đến 3 lần cho đến khi tia xịt thông ra ngoài

Xịt trực tiếp lên vết loét trong miệng, mỗi lần xịt 2-4 nhát để bao phủ toàn bộ vết thương.

Làm khô vùng vừa xịt trong khoảng 1 phút bằng cách hít vào bằng miệng.

Không ăn uống trong vòng 30 phút sau khi xịt sản phẩm.

Nên ưu tiên sử dụng sản phẩm sau khi ăn và trước khi đi ngủ để sản phẩm lưu giữ lâu, giúp hỗ trợ vết thương nhanh lành.

Trường hợp cần hỗ trợ giảm đau khi ăn uống nên xịt trước bữa ăn 10 phút và xịt lại sau khi ăn để đảm bảo hiệu quả sử dụng

Liều dùng: Sử dụng 3-8 lần một ngày tùy mức độ đau và loét.

Sản phẩm phù hợp dùng cho nhiều lứa tuổi. Dùng được cho cả trẻ em từ 2 tháng tuổi và phụ nữ cho con bú.

6. BẢO QUẢN:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

7. HẠN DÙNG:

Xem trên nhãn hộp.

**CÁC BƯỚC SỬ DỤNG
CHAI XỊT MIỆNG HỌNG LẦN ĐẦU**



Bước 1: Lắp đầu xịt vào chai



Bước 2: Để chai trên mặt phẳng như mặt bàn, dùng lòng bàn tay ấn mạnh từ trên xuống cho đến khi nghe thấy tiếng **“TÁCH”** là đã lắp đúng vị trí



Bước 3: Tháo nắp bảo vệ khỏi đầu xịt



Bước 4: Xịt mỗi vài liều đến khi tạo thành tia ở lần xịt đầu tiên



Bước 5: Sử dụng xịt vào vùng bị đau



Bước 6: Lau đầu vòi xịt sau khi sử dụng