

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

FEMALTO

drops

Hướng dẫn cách sử dụng xi lanh



THÀNH PHẦN:

Mỗi 0,1ml chứa:

Sắt 5mg (dưới dạng 17mg phức hợp sắt (III) hydroxyd polymaltose)

Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (đường kính); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 420(i)); Chất điều chỉnh độ nhớt (natri clorid); Chất điều chỉnh độ acid (INS 330, INS 524); Hương liệu tổng hợp (hương hoa quả, hương vanillin); Chất bảo quản (INS 216, INS 218); nước tinh khiết.

CÔNG DỤNG:

- Bổ sung sắt cho người có nguy cơ thiếu sắt.
- Bổ sung sắt tham gia hỗ trợ quá trình tạo máu.
- Giảm triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Trẻ em và người lớn:

- Thiếu máu do thiếu sắt.
- Có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.
- Phụ nữ mất máu do kinh nguyệt nhiều.
- Có chế độ ăn thiếu sắt.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Liều dự phòng thiếu sắt:

- Trẻ dưới 1 tuổi: 0,2ml/lần x 1 lần/ngày.
- Trẻ từ 1-dưới 14 tuổi: 0,3ml/lần x 1 lần/ngày.
- Người lớn, trẻ em từ 14 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú: 0,5ml/lần x 1 lần/ngày.

Liều bổ sung khi thiếu sắt:

- Trẻ dưới 1 tuổi: 0,5ml/lần x 1 lần ngày.
- Trẻ từ 1-dưới 14 tuổi: 0,5ml/lần x 1 lần/ngày. Có thể điều chỉnh liều lên 1ml/ngày, tùy theo chỉ định của cán bộ y tế, bác sĩ, dược sĩ.
- Người lớn, trẻ em từ 14 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú: 0,5ml/lần x 1 lần/ngày. Có thể điều chỉnh liều lên 1ml/ngày, tùy theo chỉ định của cán bộ y tế, bác sĩ, dược sĩ.
- Trẻ sinh non: 2,5 - 5mg sắt/kg/ngày trong 3-5 tháng.

Lưu ý: Liều dùng có thể điều chỉnh tùy theo chỉ định của cán bộ y tế.

* Lắc kỹ trước khi sử dụng sản phẩm.

CẢNH BÁO THẬN TRỌNG:

Không sử dụng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Không dùng chung với các sản phẩm chứa sắt khác.

BẢO QUẢN

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

